



Беркут (*Aquila chrysaetos*) был и остается наиболее редким из орлов Самарской области. Его статус за последний 10 лет не изменился. Гнездование до сих пор достоверно не установлено, хотя предполагается всего в количестве 2-3-х пар (в Бузулукском и Рачейском борах).



Могильник (*Aquila heliaca*) наиболее обычный из настоящих орлов. Известно 88 гнездовых участков. Произошло перераспределение птиц: в северной половине области численность сократилась в 2-3 раза, но при этом многие гнездовые группировки в центре области уплотнились, и могильник стал расселяться на юг. В целом численность остается стабильной и по-прежнему оценивается в 90-100 пар.



Большой подорлик (*Aquila clanga*) гнездится на Б. Черемшане и в пойме Волги. В настоящее время установлено гнездование 6 пар. Общая численность относительно стабильна и оценивается 11-13 пар.



Степной орел (*Aquila nipalensis*) редкий гнездящийся вид юга области. На конец 90-х гг. численность оценивалась в 45-55 пар. Исследования 2007 г. показали 4-х кратное сокращение численности степного орла, современная численность на гнездовании в области не превышает 11-15 пар.



В 2007 году по заданию Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Самарской области реализованы мероприятия по восстановлению численности хищных птиц Самарской области.

В том числе, проведены учеты численности. Проведена инвентаризация известных мест обитания пернатых хищников, занесенных в Красную книгу. Подготовлена геоинформационная система "Хищные птицы Красной книги Самарской области" (I этап). Вся полученная информация будет использоваться для сохранения и восстановления популяции пернатых хищников Самарской области.



Правительство Самарской области
Министерство природных ресурсов
и охраны окружающей среды
Самарской области

г. Самара, ул. Невская, 1,
тел. (846) 337-70-04, факс (846) 337-07-85

© ЦС ВУЭС, 2007
© Паженков А.С., Карякин И.В., 2007
<http://econet.universite.ru>

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ ХИЩНЫХ ПТИЦ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ



Изменение численности
редких пернатых хищников
Самарской области за
последние 10 лет



Скопа (*Pandion haliaetus*) была и остается редким гнездящимся видом Самарской области. Единственная гнездовая группировка на Самарской Луке (4 известных гнездовых участка) остается стабильной и ее численность оценивается в 4-8 пар.



Курганник (*Buteo rufinus*) в конце 90-х гг. был редким гнездящимся видом юга области. Численность оценивалась в 50 пар с некоторой тенденцией к росту. Ситуация кардинально изменилась за последние 5 лет в худшую сторону. В современный период в Самарской области можно лишь предполагать гнездование не более 5 пар на юге области.



Балобан (*Falco cherrug*) вероятно исчезнувший на гнездовании в области вид. В девяностые годы численность оценивалась в 2-6

пар, однако на всех известных гнездовых участках к 2007 г. вид перестал регистрироваться.

Сапсан (*Falco peregrinus*) редкий гнездящийся вид, численность которого не превышает 5 пар.



Орлан-белохвост (*Haliaeetus albicilla*) обычный гнездящийся вид побережий волжских водохранилищ. Известно 72 гнездовых участка. Численность оценивается в 90-100 пар с продолжающейся тенденцией роста, вследствие чего отдельные пары выселяются на искусственные водоемы, значительно удаленные от Волги.



Степной лунь (*Circus macrourus*) относительно стабильно в количестве 2-20 пар гнездится лишь на Майтуге. Численность в области оценивается в 15-350 пар и резко изменяется по годам в зависимости от обилия мышевидных грызунов.



Гнездится исключительно на скальных обнажениях Волги, преимущественно на Самарской Луке. Из 4-х известных гнездовых участков на одном к 2007 г. соколы перестали гнездиться.

Сокращение численности происходит из-за усиления беспокойства человеком и хищничества филина.

Филин (*Bubo bubo*) обычный (для своего размерного класса) гнездящийся вид. Известно 57 гнездовых участков, а численность оценивается в 90-100 пар.

В 2007 г. на всех проверенных на Самарской Луке гнездовых участках, выявленных в 1997-98 гг., зарегистрировано успешное размножение. На юге области количество гнездовых участков несколько увеличилось, вероятно, по причине резкого снижения выпаса скота в овражно-балочной сети, однако успешность размножения снизилась.



Орел-карлик (*Hieraetus pennatus*) активно расселяется и увеличивает численность. Известно 22 гнездовых участка, 10 из которых выявлены в 2007 г. Численность оценивается в 91-113 пар с тенденцией к дальнейшему росту.



Тювик (*Accipiter brevipes*) редкий гнездящийся вид, численность которого постепенно растет. В настоящее время известно гнездование 45 пар— все в пойменных лесах рек южной половины Заволжья. Численность оценивается в 200-300 пар.



Змееяд (*Circus gallicus*) крайне редкий гнездящийся вид области. Установлено гнездование 3-х пар, а численность оценивается в 4-8 пар и остается стабильно низкой на протяжении 10 лет.



Степная пустельга (*Falco naumanni*) гнездится на крайнем юге области в количестве 5-25 пар. Отмечавшаяся в конце 90-х гг. тенденция к увеличению численности, по наблюдениям 2007 г. не подтвердилась.